

# F

## Poltiglia 20 pb

**Anticrittogamico per uso agricolo.  
Solfato di rame neutralizzato nella calce.  
Polvere bagnabile pronta all'uso.**



### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

**VITE:** contro Peronospora, Escoriosi, Black rot e azione collaterale contro Muffa grigia (Botrite) trattamenti pre-fiorali 600-700 g/hl, trattamenti post-fiorali 700-1000 g/hl, -trattamenti di "chiusura" 1000-1200 g/hl.

**POMACEE:** (Melo, Pero, Cotogno) contro Ticchiolatura, Monilia e Septoria, Cancri rameali, Maculatura Bruna (Alternaria), trattamenti autunnali 800-1600 g/hl -trattamenti di fine inverno 800-1200 g/hl -trattamenti pre-fiorali 800-1000 g/hl. Contro Erwinia amylovora (Colpo di fuoco batterico) trattamenti post-fiorali 500 g/hl.

**DRUPACEE** (Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Nespole), **MANDORLO:** limitare i trattamenti al periodo autunno-inverno contro Bolla, Corineo (Gommosi), Monilia, Bozzacchioni, Batteriosi, Marciume del colletto, Sclerotinia, Cancri rameali trattamenti autunnali 800-1600 g/hl - trattamenti di fine inverno 800-1200 g/hl.

**OLIVO:** contro occhio di pavone (Cicloconio), Lebbra e Fumaggini trattamenti di fine inverno e all'invaiaura 800-1200 g/hl.

**ACTINIDIA:** contro marciume del colletto 10-15 litri di soluzione alla base del fusto 800-1200 g/hl contro batteriosi trattamenti a caduta foglie 500-600 g/hl.

**AGRUMI:** (Arancio, Limone, Mandarino ecc.): contro allupatura, Mal secco, Cancro gommoso, Batteriosi, Fumaggine, Marciume del colletto, trattamenti autunnali (invaiaura) 800-1200 g/hl - trattamenti fine inverno-primavera 800-1200 g/hl.

**NOCE, NOCCIOLO ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO** contro Batteriosi, Antracnosi, Cancri del legno trattamenti primaverili-estivi 600-800 g/hl - trattamenti autunnali 1000-1200 g/hl.

**FRAGOLA:** contro Vaiolatura, Marciume del colletto, Antracnosi alla ripresa vegetativa 500-1000 g/hl.

**TABACCO E OLEAGINOSE:** (soia, girasole, colza, arachide, lino, ravizzone, senape, sesamo) contro Peronospora, Batteriosi (Pseudomonas tabaci) al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia 5-7 kg/Ha.

### ORTAGGI A FOGLIA ed ERBE FRESCHE:

(cavoli, carciofo, cardo, asparago (limitare i trattamenti subito dopo la raccolta dei turioni), sedano, lattuga, scarola, cicoria, indivia, dolcetta, crescione, radicchio, rucola, spinacio, bietola da foglia e da costa, basilico, prezzemolo, finocchio, ecc.) contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi, Ruggini, Cercospora, al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia 500-1000 g/hl.

**PATATA, POMODORO e ORTAGGI A FRUTTO:** (melanzana, cetriolo, zucca, zucchini, melone, cocomero, ecc.) contro Peronospora, Alternaria, Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Marciumi da Botrytis, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia 500-1000 g/hl.

**FAGIOLO, PISELLO e ORTAGGI A RADICE:** (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc.) contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cercosporiosi, Ruggini al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia 500-1000 g/hl.

**ORTAGGI A BULBO:** (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, porro, ecc.) contro Peronospora, Alternaria, Ruggini al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia 500-100 g/hl.

**FLORICOLTURA:** (rosa, geranio, garofano, crisantemo, ecc.) contro Peronospora, Ruggini, Ticchiolatura, Alternaria, Antracnosi, Septoriosi, ecc. al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia 500-1000 g/hl.

**PIANTE FORESTALI E ORNAMENTALI:** (conifere, cipresso, oleandro, ecc.) contro Cancri, Corineo, Batteriosi - trattamenti primaverili-estivi 700-1000 g/hl - trattamenti autunnali 800-1500 g/hl.

**CONCIA SEMENTI DEI CEREALI:** (escluso Mais, Sorgo, Riso) contro Carie 200 g / 100 Kg seme.



### COMPOSIZIONE

Rame metallo g. 20  
(sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce)  
Coformulanti q.b. ag. 100

### FORMULAZIONE

Polvere Bagnabile

### CONFEZIONE



### COLORAZIONE

Blu o non colorato (green)

### CLASSIFICAZIONE

Xi - irritante  
N - pericoloso per l'ambiente

### MISCIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con i principali antiparassitari ed in particolare con gli zolfi bagnabili.

### TEMPO DI CARENZA

3 gg. fragola, patata, pomodoro, melanzana, ortaggi a radice, ortaggi a bulbo, cucurbitacee  
7 gg. ortaggi a foglia, erbe fresche  
20 gg. altre colture  
40 gg. pomacee

### REGISTRAZIONE

N. 13635 del 11.12.2006